

Gmina Pelplin

Uwaga! Zwiększone zagrożenie pryszczycą (FMD) w Unii Europejskiej



Kategoria - Aktualności

Data publikacji -11 kwietnia 2025 godz. 10:22

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

W związku z dynamiczną sytuacją epizootyczną dotyczącą **pryszczycy (FMD)** w Unii Europejskiej, istnieje **konieczność podnoszenia świadomości** wśród podmiotów utrzymujących zwierzęta z gatunków wrażliwych. Wiedza na temat choroby, jej objawów, sposobów zakażenia i metod zapobiegania ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa hodowli.

Zalecenia:

- **Zwierzęta wprowadzane do stada** powinny pochodzić z pewnego źródła i być zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie oraz status zdrowotny – dotyczy to w szczególności handlu wewnątrznajmniejszego.
- W celu **ochrony stada przed wirusem** pryszczycy należy stosować odpowiednie środki bioasekuracji oraz zachować czujność wobec podejrzanych objawów choroby.

Natalia Styka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie

Pryszczycy (FMD) – Co musisz wiedzieć?

Czym jest pryszczycy?

Pryszczycy to wyjątkowo zaraźliwa choroba wirusowa atakująca zwierzęta parzystokopytne – zarówno udomowione, jak i dzikie. Dotyczy m.in. bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych, bawołów i jeleni. Choroba objawia się powstawaniem bolesnych pęcherzy, przede wszystkim w jamie ustnej i na kończynach.

Typowe objawy u zakażonych zwierząt to:

- obfite ślinienie,
- mlaskanie,
- nadżerki i pęcherze,
- gorączka,
- spadek apetytu i niechęć do ruchu,
- kulawizna,
- spadek mleczności,
- ronienia.

U młodych osobników (np. prosiąt, jagniąt, kozłąt) choroba może prowadzić do nagłej śmierci bez widocznych objawów.

Jak dochodzi do zakażenia?

Głównym sposobem transmisji wirusa jest bezpośredni kontakt między zwierzętami. Jednak choroba może również rozprzestrzeniać się przez:

- paszę, ściółkę, sprzęt i pojazdy,
- ludzi mających kontakt z zakażonymi zwierzętami,
- produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso itp.),
- drogę kropelkową (aerozol z wirusem).

Jak zapobiegać pryszczycy?

Ryzykowne zachowania zwiększają szansę zakażenia. Kluczowe są działania zapobiegawcze wspólne dla różnych chorób zakaźnych:

W przypadku podejrzenia ognisk choroby w pobliżu:

- **Unikaj:**
 - kontaktów między zwierzętami z różnych stad (np. przez ogrodzenie, na pastwisku),
 - odwiedzania innych gospodarstw ze zwierzętami,
 - korzystania ze wspólnych narzędzi, sprzętu, pojazdów i personelu.
- **Stosuj:**
 - izolację i obserwację przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia,
 - ochronną odzież i obuwie do obsługi zwierząt,
 - dezynfekcję obuwia przed wejściem do budynków gospodarskich.
- **Szczepienia:**
 - Szczepionki przeciwko pryszczycy są dostępne, ale ich stosowanie powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych.

Dlaczego to takie ważne?

Pryszczyca może powodować znaczne straty ekonomiczne – zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Dlatego regularna obserwacja zwierząt oraz szybka reakcja są kluczowe.

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia choroby należy **niezwłocznie poinformować Inspekcję Weterynaryjną**. Zgłoszenie jest obowiązkowe i niezbędne, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.